

ЄДИНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ
ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ
ШИРОКОГО СПЕКТРА БУР'ЯНІВ
У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ



Діючі речовини
топрамезон (50 г/л) +
дикамба (160 г/л)



Хімічна група д.р.
трикетони + похідні
бензойної кислоти



Препаративна форма
розчинний концентрат (РК)




Розподіл у рослині
системний



Упаковка
пластикові каністри 5 л



Гарантійний термін зберігання
48 місяців



Температура зберігання
0...+40°C

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ


- Зручність у використанні (нова покращена формуляція, зменшення витрат на логістику)
- Широкий спектр дії на бур'яни
- Ефективно контролює надземну частину ваточника сирійського
- Швидкий візуальний ефект
- Має тривалу ґрунтову дію завдяки топрамезону (захист протягом усього сезону)

 **BASF**

We create chemistry

Стеллар® Плюс

Вирок бур'янам



**Амброзія
полинолиста**

Ambrosia artemisiifolia

**Ваточник
сирійський**

Asclepias syriaca

**Просо куряче
(плоскуха)**

Echinochloa crus-galli

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норма витрати препарату	Кратність обробок	Спектр дії	Термін застосування
Кукурудза	0,8–1,25 л/га	1	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур'янів)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

За умови самостійного використання норма витрати — 1,0–1,25 л/га. При використанні в бакових сумішах слід застосовувати 0,8 л/га. Найкращими партнерами для бакової суміші є Фронт'єр® Оптіма 0,8 л/га або Акріс® 1,5 л/га. Вони підсилюють листову активність препарату Стеллар® Плюс, розширюють спектр чутливих бур'янів і подовжують період ефективного ґрунтового захисту до 40 днів.

Норма витрати робочої рідини:
200–400 л/га

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт:
не регламентуються/3 доби

Строк очікування (днів до збору врожаю):
не регламентується

Сумісність з іншими препаратами:
Препарат може бути використаний у бакових сумішах (в окремих випадках необхідно проводити тест на сумісність)

Агроцентр BASF, с. Денисівка,
Хмельницька область



Контроль

Стеллар® Плюс 1,25 л/га
через 5 тижнів
після внесення


ЧУТЛИВІСТЬ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ БУР'ЯНІВ ДО ГЕРБІЦИДУ Стеллар® Плюс



Важливо!

Після застосування гербіциду Стеллар® Плюс на наступний рік не рекомендується висівати сою, горох та інші бобові культури у зв'язку з можливим проявом фітотоксичності.

ЗАГАЛЬНА ГЕРБІЦИДНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, % (N8) 2019



Агроцентр BASF, смт Терезине,
Київська область



Контроль

Стеллар® Плюс 1,25 л/га
через 5 днів
після внесення

Стеллар® Плюс 1,25 л/га
через 3 тижні
після внесення