

ХіСтік Соя

Прагнення до досконалості

Сучасний високоефективний інокулянт для обробки насіння сої на стерильній торфовій основі



ПРОТРУЄНЕ НАСІННЯ:

- Допускається одночасне нанесення фунгіцидів та сухих інокулянтів, при цьому важливо не змішувати попередньо фунгіцид з інокулянтом, а подавати їх відразу у протруювальну машину
- За умов невикористання інокульованого насіння на посів у термін 24 години, насіння має бути оброблене інокулянтом повторно

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норма витрати препарату	Терміни застосування	Спектр дії	Кратність обробок
Соя	400 г (1 пакет) на 100 кг насіння	суха або волога інокуляція безпосередньо перед висівом насіння або за добу до сівби	сприяє акумуляції рослиною азоту в доступній формі завдяки підвищенню симбіотичного потенціалу рослини з бульбочковими бактеріями	1

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

Вологий метод інокуляції:

додайте невелику кількість води, щоб злегка зволожити насіння, та перемішайте його з інокулянтом таким чином, щоб вся поверхня насіння була покрита інокулянтом (2 мл води на 1 кг насіння)

Сухий метод інокуляції:

додайте достатню кількість інокулянту (із розрахунку 1 пакет на 100–120 кг насіння) у бункер сівалки або до протруювача, або ж ретельно змішайте інокулянт з насінням. Повільно перемішайте впродовж декількох хвилин, щоб уся поверхня насіння була покрита інокулянтом

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт:
не регламентуються

Строк очікування (днів до збору врожаю):
не регламентується

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Стабільний урожай за несприятливих умов вирощування
- Оптимальна фіксація атмосферного азоту навіть за стресових умов
- Ідеальний вибір для малих та середніх об'ємів насіння
- Сумісний майже з усіма протруйниками та іншими ЗЗР
- Тривалий термін зберігання – можливість використати у наступному сезоні

Діючі речовини

Бактерії роду *Bradyrhizobium japonicum* (штам 532 C), титр не менше 2×10^9 живих КУО на 1 г препарату

Препаративна форма

Стерилізований торф

Сумісність з іншими препаратами:

за умов сухої інокуляції можна застосовувати одночасно з протруйниками, що містять фіпроніл, тіофанат-метил, піраклостробін, карбатин, металаксил, тирам

Упаковка

Пакет 400 г

Гарантійний термін зберігання

24 місяці

Температура зберігання

+2...+8°C
Захищати від температури нижчої за 2°C