

# Кінто® Дуо

## Від здорових сходів до високого врожаю

Ефективний проти корневих гнилей, сажкових хвороб та снігової плісняви. Захищає первинну кореневу систему рослини і, як результат, сприяє збільшенню кількості продуктивних стебел



[ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ ]



**Діюча речовина**  
Тритіконазол (20 г/л) + прохлораз (60 г/л)



**Хімічна група д.р.**  
Триазоли + імідазоли



**Препаративна форма**  
Концентрат суспензії (КС)



**Розподіл у рослині**  
Системний та контактний



**Сумісність з іншими препаратами:**  
Може застосовуватися самостійно, а також у сумішах з інсектицидними протруйниками та мікроелементами



**Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт:**  
не регламентуються



**Строк очікування (днів до збору врожаю):**  
не регламентується



**Упаковка**  
Пластикові каністри 10 л



**Гарантійний термін зберігання**  
60 місяців



**Температура зберігання**  
-10...+30°С

Застосовуйте **Кінто® Дуо** в найскладніших ситуаціях – на площах із високим інфекційним фоном, у сівозмінах, насичених зерновими, при використанні мінімального обробітку ґрунту, після попередника кукурудзи, на насінневих посівах



## РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норма витрати препарату	Терміни застосування	Спектр дії	Кратність обробок
Пшениця озима	2,0–2,5 л/т	обробка насіння перед сівбою	тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз, борошнеста роса	1
Пшениця яра	2,0–2,5 л/т	обробка насіння перед сівбою	тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння	1
Ячмінь озимий	2,0–2,5 л/т	обробка насіння перед сівбою	сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість	1
Ячмінь ярий	2,0–2,5 л/т	обробка насіння перед сівбою	сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість	1
Жито	2,0–2,5 л/т	обробка насіння перед сівбою	кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспоріозна), ризоктоніоз, церкоспорельоз, сажкові хвороби, ринхоспоріоз, снігова пліснява, пліснявіння насіння	1
Тритикале	2,0–2,5 л/т	обробка насіння перед сівбою	кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспоріозна), ризоктоніоз, церкоспорельоз, сажкові хвороби, ринхоспоріоз, снігова пліснява, пліснявіння насіння	1

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- **Кінто® Дуо** містить у своєму складі, поряд із діючими речовинами, ад'ювант і барвник та є цілком готовим для безпосереднього використання
- При передпосівній підготовці насіння зернових культур використовують суспензію препарату з розрахунку 10 л (7,5–8 л води + 2,0–2,5 л **Кінто® Дуо**) на 1000 кг насіння
- Для протруювання доцільно використовувати якісний, відкалібрований та очищений посівний матеріал, що не має механічних пошкоджень. Це гарантує рівномірне та якісне нанесення препарату на насіння

## ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Поєднання двох діючих речовин з системною і контактною дією забезпечує локальну дезінфекцію ґрунту та захист насіння і сходів культури від ураження збудниками хвороб
- Ефективний для контролю корневих гнилей, сажкових хвороб і снігової плісняви
- Захищає первинну кореневу систему рослини та сприяє збільшенню кількості продуктивних стебел

Препарат навіть за посушливих умов не викликає фітотоксичності у рослин та має широкий спектр контрольованих хвороб насіння та сходів.

**Кінто® Дуо** є обов'язковим до застосування на насінневих посівах і посівах, які вирощуються за інтенсивною технологією в умовах надмірного та достатнього зволоження за високого рівня насичення сівозміни зерновими культурами.

**Кінто® Дуо** є основою для отримання здорових і дружних сходів та високого врожаю.

