

BASF

We create chemistry

AgCelence®
Отримай більше

Пріаксор®

Мінімальні витрати —
максимальна
комплектація

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ



Діючі речовини

Ксеміум® (флуксапіроксад), 75 г/л + піраклостробін, 150 г/л



Хімічна група д.р.

піразол-4-карбоксаміди (SDHI) + стробілурини



Препаративна форма

концентрат, що емульгується (KE)



Розподіл у рослині

системний, контактний і трансламінарний



Упаковка

пластикові каністри 5 л



Гарантійний термін зберігання

36 місяців



Температура зберігання

-10...+40°C

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норма витрати препарату	Терміни застосування	Спектр дії	Кратність обробок
Пшениця озима та яра	0,3–0,5 л/га	в період вегетації	піренофороз, іржа, септоріоз листя і колосу, борошниста роса*	2
Ячмінь озимий та ярий	0,3–0,5 л/га	в період вегетації	сітчаста, смугаста і темно-бура плямистості, ринхоспоріоз, іржа, борошниста роса*	2
Жито озиме та яре	0,3–0,5 л/га	в період вегетації	септоріоз, ринхоспоріоз, іржа, борошниста роса*	2

Норма витрати робочої рідини: 100–300 л/га

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних | механізованих робіт: не регламентуються | 3 доби

Строк очікування (днів до збору врожаю): 30 днів

Сумісність з іншими препаратами:

За необхідності може застосовуватись у бакових сумішах з іншими засобами захисту рослин (в окремих випадках необхідно проводити тест на сумісність)

Рекомендації щодо використання:

Рекомендований час застосування у фазах початку виходу в трубку (BBCH 31–32) та прапорцевого листка (BBCH 37–39).

Уникайте використання фунгіциду за високих температур (вище +25°C) і низької вологості повітря (нижче 40%)

* Середня ефективність

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

Ефективний контроль основних хвороб зернових, у тому числі піренофорозу

Можливість використання зменшеної кількості робочого розчину

Комбінація Ксеміум® та піраклостробіну зменшує ризик виникнення резистентності

Висока лікувальна дія Ксеміум®

AgCelence®-ефект

ЦІННІСТЬ ДЛЯ АГРОВИРОБНИКА

Актуальність проблематики піренофорозу в Україні зростає; тепер я можу бути спокійним, адже на ринку є ефективне рішення для його контролю

Відсутність необхідності використовувати великі об'єми води та часто поповнювати її запаси зекономить мої кошти, час і ресурси


Тепер я можу бути впевненим у теперішньому і майбутньому

Відсутність триазольного компоненту у складі продукту мене не бентежить

Я можу очікувати більше від продукту, ніж виключно фунгіцидна дія

Перший Ксеміум®-вмісний фунгіцид з високотехнологічною формуляцією за доступною ціною

ПРІАКСОР® ПРИМНОЖУЄ ВАШ ПРИБУТОК НА ПШЕНИЦІ



Найвища прибавка урожаю


+7,7 ц/га

у нормі 0,3 л/га у порівнянні з фунгіцидами низькоцінового сегменту Т1

АЦ Решетилівка
Сорт Подільська
Внесення у **GS 31**

Середні ціни дистрибуторів згідно з даними Клеффманн 2020
Середні ціни на пшеницю третього класу станом на листопад 2020 року

ПРІАКСОР® — УРОЖАЙНА БОМБА НА ЯЧМЕНІ ТА ВІДМІННИЙ КОНТРОЛЬ СІТЧАСТОЇ ПЛЯМИСТОСТІ



Прибавка урожаю від двократного внесення Пріаксор®


+12,4 ц/га

Двократне внесення Пріаксор® по 0,3 л/га в умовах інтенсивного поширення хвороби *Pyrenophora teres* забезпечило високу ефективність контролю на рівні високоцінових SDHI-продуктів

АЦ Денисівка 2020
Внесення у фазу **ВВСН 31 (А)** та у фазу **ВВСН 39 (В)**

Середні ціни дистрибуторів згідно з даними Клеффманн 2020

ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛЯЦІЯ ПРІАКСОР® ЗАБЕЗПЕЧУЄ КРАЩІ УТРИМАННЯ ТА РОЗПОДІЛ КРАПЛІ НА ЛИСТОВІЙ ПОВЕРХНІ




■ На 100 л/га робочого розчину*

Дослід, проведений технічними експертами компанії BASF у 2019 році

* Використання знижених норм робочого розчину рекомендується лише за оптимальних погодних умов

ЗМЕНШЕНИЙ ВИЛИВ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ З ПРІАКСОР® ВІД 100 Л/ГА НЕ ЗМІНЮЄ ЙОГО ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ



Однакова ефективність!

- За 200 л/га та 100 л/га робочого розчину
- За різної швидкості руху (5–14 км/год)
- За різного розміру крапель (дрібні 145–225 мкм | дуже великі 401–500 мкм)

ФОТО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИАКСОР®

20 днів після внесення

Озима пшениця, ураження септоріозом
Агроцентр BASF, Київська обл., 2019



Контроль



Пріаксор® 0,3 л/га ВВСН 37-39

Озима пшениця, ураження септоріозом
Демоцентр BASF, Вінницька обл., 2020



Контроль



Пріаксор® 0,3 л/га ВВСН 37-39

Ярий ячмінь, ураження сітчастою плямистістю
Агроцентр BASF, Хмельницька обл., 2019



Контроль



Пріаксор® 0,3 л/га ВВСН 37-39

Ярий ячмінь, ураження сітчастою плямистістю
Агроцентр BASF, Хмельницька обл., 2020



Контроль




Пріаксор® 0,3 л/га ВВСН 39

ДОСЛІДИ В ДЕМОЦЕНТРАХ BASF УРОЖАЙНІСТЬ З ПРИАКСОР®


Озима пшениця, Херсонська обл., 2020
Однократне внесення у фазу ВВСН 32

+ 6 ц/га




Озимий ячмінь, Дніпропетровська обл., 2020
Однократне внесення у фазу ВВСН 31

+ 7 ц/га




Ярий ячмінь, Харківська обл., 2020
Однократне внесення у фазу ВВСН 31

+ 5 ц/га



Ярий ячмінь, Рівненська обл., 2020
Двократне внесення
в фазу ВВСН 31 та ВВСН 39

+ 11 ц/га



Пріаксор®

Мінімальні витрати –
максимальна комплектація

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА
ФОРМУЛЯЦІЯ

КСЕМІУМ®
+
ПІРАКЛОСТРОБІН

ВИСОКА
ЛІКУВАЛЬНА ДІЯ

СЕПТОРІОЗ

СІТЧАСТА
ПЛЯМИСТІСТЬ

РИНХОСПОРІОЗ

ПІРЕНОФОРОЗ

ВИЛИВ ВОДИ

100 Л 300



T1.....T2

ВВСН 21-32 ВВСН 37-49

НОРМА ВНЕСЕННЯ

0,3 0,4 0,5
л/га



BASF
We create chemistry