


The BASF logo, consisting of a white square with a smaller white square inside, followed by the letters "BASF" in a bold, white, sans-serif font.

We create chemistry















Номолт®

Інсектицид для інтегрованого захисту

www.agro.basf.ua

 BASF Crop protection UA



	Діюча речовина	тефлубензурон (150 г/л)	
	Хімічна група д.р.	бензоілсечовини	
	Препаративна форма	концентрат суспензії (КС)	
	Розподіл у рослині	контактний	
	Упаковка	пластикові пляшки 1 л	
	Гарантійний термін зберігання	36 місяців	
	Температура зберігання	-5...+40°C	
	Культура	картопля, виноград, капуста, яблуна	
	Норма витрати препарату	картопля	0,15 л/га
		виноград	0,5 л/га
		капуста	0,3 л/га
		яблуна	0,5–0,7 л/га
	Спектр дії	картопля	колорадський жук
		виноград	листовійки
		капуста	совки, білянки, міль
		яблуна	плодожерки, листовійки
	Терміни застосування	картопля	обприскування в період вегетації; проти личинок першого та другого покоління
		виноград	обприскування в період вегетації; 8–10 днів після виходу дорослих особин з кокону
		капуста	обприскування в період вегетації; личинки в початковій фазі розвитку
		яблуна	обприскування в період вегетації
	Норма витрати робочої рідини	200–1000 л/га	
	Строк очікування (днів до збору врожаю)/кратність обробок	30 днів/2	
	Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт	картопля, капуста: 10 діб/4 доби виноград, яблуна: 7 діб/3 доби	

Рекомендації при використанні:

Для попередження збитків, завданих комахами-шкідниками, необхідно як можна раніше перервати розвиток їх личинок, через те, що безпосередньо в цій стадії завдаються пошкодження культурам. Тому застосувати препарат необхідно раніше, ніж використовуються традиційні інсектициди, а саме – під час відкладання яєць дорослими комахами, що збігається з їх інтенсивним льотом

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- Висока селективність – ідеальний інсектицид для використання в інтегрованих системах захисту
- Ефективний проти комах, стійких до інших інсектицидів
- Висока стійкість до змивання опадами
- Швидка та тривала дія
- Овіцидна дія та здатність запобігати відкладенню деякими видами дорослих комах життєздатних яєць
- На відміну від інших інсектицидів, препарат Номолт® не має нейротоксичного впливу на шкідливих комах, а діє як природний регулятор росту. Після обробки інсектицидом личинки гинуть під час линьки чи лялькування

